Till projektledare Daniel Svensson Socialstyrelsen

Socialstyrelsen, behandling med metylfenidat, amfetamin och självmord

18 januari 2018

Bäste Daniel,

Jag har läst Socialstyrelsens nya rapport, *Felanvändning av metylfenidat* (1), och har några frågor och lite data att bidra med.

Vi kan på sidan 15 i rapporten läsa om de narkotikarelaterade dödsfall som Socialstyrelsen funnit för åren 2012-2015. För 2015 anges *15 fall* där metylfenidat nämnts på dödsorsaksintygen.

Ingenstans i rapporten omnämns de självmord som begåtts under behandling med/illegalt intag av metylfenidat, men jag antar att Socialstyrelsen faktiskt har tillgång till opublicerade uppgifter i området, och vill gärna få kommentarer och svar på några frågor om detta.

Jag har med stöd av offentlighetsprincipen från RMV utfått uppgifter om samtliga obducerade säkra självmord för 2015 (n=1193) och 2016 (n=1128) (i stort sett motsvarande antalet i Socialstyrelsens dödsorsaksregister), med data om vilka substanser som personerna hade i blodet vid dödstillfället.

Vi finner ***37 självmord under 2015*** och ***32 under 2016*** där metylfenidat hittats vid obduktionen; alltså sammanlagt ***69 självmord med metylfenidat i kroppen*** vid dödstillfället under dessa två år. Dessutom hittar vi för de två åren ***79 fall där personerna hade amfetamin i kroppen*** (med en kraftig ökning för den gruppen 2016).

Vi finner vid en flyktig analys av dessa självmord följande:

- 35/69 personer, 51 %, hade 3 eller fler psykofarmaka i kroppen i tillägg till metylfenidat;
- 47/69 personer, 68 %, hade andra narkotikaklassade ämnen i kroppen, i tillägg till metylfenidat;
- 69 av de 79 fallen med amfetamin i kroppen (27 för 2015, 52 för 2016) hade inte samtidigt intag av metylfenidat;
- 138 personer begick alltså självmord under 2015-2016 med antingen metylfenidat eller amfetamin i kroppen.

Detaljerade data om *metylfenidat* kan hittas i dessa från RMV utlämnade uppgifter för 2015-2016 http://jannel.se/MetylfenidatSjalvmord2015-2016SWE.pdf

Jag vill med anledning av det ovanstående ställa följande frågor:

1. Har Socialstyrelsen tagit fram data om hur många av de *69 personer* som begick självmord med *metylfenidat* i kroppen (2015-2016) som fått preparatet *förskrivet*, jämfört med hur många som fått preparatet på annat sätt? (Jag antar att det är relativt enkelt att samarbeta med RMV, jämföra data i dödsorsaksregistret om självmord med Socialstyrelsens läkemedelsregister.)

2. Har Socialstyrelsen tagit fram data om hur många av de *79 personer* som begick självmord med *amfetamin* i kroppen (2015-2016) som fått preparatet *förskrivet*, jämfört med hur många som fått preparatet på annat sätt? Det ska noteras att antalet personer som haft amfetamin i kroppen vid självmordstillfället fördubblats – 27 till 52 – under de två åren, samtidigt som förskrivningen av dexamfetamin/lisdexamfetamin ökat från 20 000 personer till 32 000 personer; en ökning med 60 %; av preparat som sägs stå under ”utökad övervakning”.

3. Har Socialstyrelsen tagit fram data om *förskrivningsmönstret* för de personer som begått självmord med metylfenidat i kroppen, *där alltså 51 % av personerna hade tre eller flera psykofarmaka i kroppen, i tillägg till metylfenidat*?

Ordföranden för den nordiska delen av Cochraneinstitutet Peter Götzsche skriver (Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse): ”Det är dålig läkekonst att skaka fram ytterligare diagnoser när en person står under inflytande av neuroaktiva kemikalier, eftersom symtomen då sannolikt är läkemedelsinducerade.” Så, hur har det kunnat ske att det hos 51 % av de personer som begått självmord med metylfenidat i kroppen, samtidigt kunnat hittas tre eller flera psykofarmaka? Har personerna fått ADHD-preparat, fått skadeverkningar som betraktats som en *ny* psykisk störning, som i sin tur lett till förskrivning av antidepressiva, med nya skadeverkningar, som i sin tur lett till förskrivning av bensodiazepiner, sömnmedel och vidare till neuroleptika?

4. Har Socialstyrelsen noterat att *inga* rapporter om misstänkt biverkning av behandling med metylfenidat eller amfetamin, där resultatet var självmord, har inkommit till Läkemedelsverkets biverkningsregister för 2015-2016? Inga av de fall som beskrivits ovan har alltså utretts av Läkemedelsverket som en möjlig skadeverkan av preparaten.

Tacksam för ett skyndsamt svar på frågorna.

Vänliga hälsningar

Janne Larsson
skribent/researcher
janne.olov.larsson@telia.com

1. Socialstyrelsen, Felanvändning av metylfenidat, januari 2018, http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20798/2018-1-2.pdf